

# MODULO CINGHIALE BASE



# Inquadramento sistematico specifico: *cinghiale*

Il Genere *Sus* comprende le forme di Suiformi più generaliste, caratterizzate da dentatura bunodonte ed arti e tratto digestivo meno specializzati. Secondo la revisione sistematica più recente il genere comprende 7 specie, di cui *Sus scrofa* è quella a più ampia distribuzione.

Ancora incerta e non completamente chiara risulta la sistematica a livello sottospecifico, ulteriormente complicata da due ordini di fattori legati alle attività umane: l'ibridazione delle popolazioni selvatiche con i conspecifici domestici e l'incrocio con forme evolutesi in aree geografiche differenti ed introdotte dall'uomo in zone estranee al loro areale originario. È stato verificato, in ambito europeo, un cline nella dimensione media dei soggetti delle diverse popolazioni lungo un gradiente geografico da nord-est a sud-ovest, spiegabile soprattutto in base alle diverse condizioni ecologiche. Le incertezze sul reale significato sistematico delle 16 sottospecie generalmente riconosciute fanno sì che attualmente ci si limiti ad individuare 4 informali raggruppamenti geografici regionali (razze occidentali, comprendenti le sottospecie europee, razze indiane, orientali e indonesiane), nei quali vengono inserite le varie sottospecie al fine di distinguerne determinate caratteristiche morfologiche.

**Superordine:** Ungulati (*Ungulata*)

**Ordine:** Artiodattili (*Artiodactyla*)

**Sottordine:** Suiformi (*Suiformes*)

**Famiglia:** Suidi (*Suidae*)

**Sottofamiglia:** Suini (*Suinae*)

**Genere:** *Sus*

**Specie:** *Sus scrofa* Linnaeus, 1758



Da: Spagnesi M., A. M. De Marinis (a cura di),  
2002 - Mammiferi d'Italia. Quad. Cons. Natura,  
14, Min. Ambiente - Ist. Naz. Fauna Selvatica.


# Razze occidentali (o sottospecie) ???

- *Sus s. scrofa*: Europa occidentale e centrale
- *Sus s. meridionalis* (?): Sardegna e Corsica  
(discende da maiali rinselvaticiti)
  - *Sus s. castilianus*: Penisola iberica
    - *Sus s. majori*: Italia tirrenica
  - *Sus s. falzfeini*: Europa nord-orientale
    - *Sus s. reiseri*: Balcani
- *Sus s. attila*: Romania ed Europa sud-orientale

# Distribuzione europea: cinghiale

*Sus scrofa*

Mappe tratte da:  
[Societas Europaea](#)  
[Mammalogica](#)



L'areale originario del cinghiale è uno dei più vasti tra quelli che caratterizzano gli Ungulati selvatici e copre gran parte del continente europeo. La specie risulta assente in Islanda, Irlanda, Scozia, Inghilterra e in gran parte della penisola scandinava nella quale non risulta presente in Norvegia, mentre è distribuita in maniera discontinua o caratterizzata da basse densità in Finlandia, Svezia e Danimarca.

Da: Pedrotti L., E. Duprè, D. Preatoni, S. Toso, 2001 - Banca Dati Ungulati: *status*, distribuzione, consistenza, gestione, prelievo venatorio e potenzialità delle popolazioni di Ungulati in Italia. Biol. Cons. Fauna, 109: 1-132.

Specie dotata di grande plasticità ecologica ed in grado di sfruttare anche ambienti fortemente rimaneggiati dall'uomo, il cinghiale è andato incontro nell'ultimo trentennio ad un incredibile esplosione demografica che ha coinvolto tutti i paesi europei.

**Diversi sono i fattori che hanno determinato questa esplosione delle popolazioni di cinghiale:**

- **Cambiamenti socio-economici, come l'abbandono delle campagne, che hanno creato condizioni ambientali maggiormente favorevoli alla specie;**
- **Immissioni;**
- **Assenza di predatori;**
- **Foraggiamento artificiale;**
- **Regolamentazione dell'attività venatoria .**

# Status, origini e consistenza delle diverse popolazioni italiane: *status distributivo*

In relazione alla sua ampia valenza ecologica e alle notevoli manipolazioni operate sulle popolazioni dal l'uomo, il cinghiale è l'Ungulato che attualmente possiede in Italia il più vasto areale, che si estende complessivamente per circa 170.000 Km pari al 57% del territorio nazionale. Il suide è distribuito, senza soluzione di continuità, dalla Valle d'Aosta, attraverso le Alpi occidentali e gli Appennini, sino alla Calabria e in tutta la Sardegna, ad eccezione della costa marchigiana e abruzzese settentrionale, di vaste zone della Puglia e delle aree fortemente antropizzate attorno a Roma e Napoli. In Sicilia la sua presenza è frutto di immissioni assai recenti. Complessivamente il cinghiale è diffuso in 90 province su 103 (87%); in 66 (73%) di queste le popolazioni sono consistenti e ben distribuite, in 17 (19%) il cinghiale occupa il territorio in modo discontinuo e con nuclei tra loro isolati e in 7 (8%) la sua presenza è ancora sporadica.



Da: Pedrotti L., E. Duprè, D. Preatoni, S. Toso, 2001 - Banca Dati Ungulati: *status*, distribuzione, consistenza, gestione, prelievo venatorio e potenzialità delle popolazioni di Ungulati in Italia. Biol. Cons. Fauna, 109: 1-132.



# Status, origini e consistenza delle diverse popolazioni italiane: origini

La forma autoctona delle regioni settentrionali italiane scomparve prima che potesse essere caratterizzata dal punto di vista sistematico, mentre carenti risultano le informazioni disponibili sull'origine di *Sus scrofa meridionalis* e *Sus scrofa majori* (De Beaux e Festa, 1927), formalmente presenti rispettivamente in Sardegna e Maremma. Recenti studi basati sull'analisi craniometrica ed elettroforetica hanno messo in luce come la popolazione maremmana non sia sostanzialmente diversa dalle altre presenti nella restante parte della penisola (*Sus scrofa scrofa*), ma debba essere considerata un ecotipo adattato all'ambiente mediterraneo, mentre la sottospecie presente in Sardegna se ne differenzia, sia morfologicamente che geneticamente, facendo ipotizzare una sua origine da suini domestici anticamente inselvaticiti. In tempi storici il cinghiale era presente in gran parte del territorio italiano. A partire dalla fine del 1500 la sua distribuzione andò progressivamente rarefacendosi, a causa della persecuzione diretta cui venne sottoposto da parte dell'uomo. Estinzioni locali successive si registrarono in Trentino (XVII secolo), Friuli e Romagna (XIX secolo), Liguria (1814); il picco negativo venne raggiunto negli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale, quando scomparvero le ultime popolazioni viventi sul versante adriatico della penisola. Il cinghiale ricomparve in modo autonomo nell'Italia nord-occidentale attorno al 1919, quando alcuni soggetti provenienti dalla Francia colonizzano parte della Liguria e del Piemonte. A partire dalla fine degli anni '60 è iniziata una nuova crescita delle popolazioni con un progressivo ampliamento dell'areale, sino alla situazione odierna.



Da: Pedrotti L., E. Duprè, D. Preatoni, S. Toso, 2001 - Banca Dati Ungulati: *status*, distribuzione, consistenza, gestione, prelievo venatorio e potenzialità delle popolazioni di Ungulati in Italia. Biol. Cons. Fauna, 109: 1-132.

# Status, origini e consistenza delle diverse popolazioni italiane: *consistenza*



Secondo una stima orientativa e largamente approssimata, basata sul numero di soggetti abbattuti annualmente (a loro volta spesso frutto di stime ed estrapolazioni), sul territorio nazionale sarebbero presenti non meno di 300.000-500.000 cinghiali. Il quadro relativo alle conoscenze circa le densità e le consistenze delle diverse popolazioni italiane rimane tuttora alquanto carente e poco conosciuto, come conseguenza di una gestione del patrimonio faunistico che, a parte alcune eccezioni, risulta priva delle indispensabili basi tecnico-scientifiche e di un'adeguata programmazione e coordinamento degli interventi. Informazioni relative alle caratteristiche demografiche ed ecologiche delle popolazioni sono disponibili solo per singole realtà territoriali. Il coinvolgimento ed il coordinamento nella raccolta delle informazioni, da parte degli enti locali competenti per territorio, dovrebbe configurarsi quale primo passo per migliorare le necessarie conoscenze sulla specie e per individuare future più razionali strategie di gestione.

Regione	Presenza
Piemonte	Presente diffusamente
Val d'Aosta	Presente diffusamente
Lombardia	Presente in nuclei disgiunti
Trentino-Alto Adige	Presente in nuclei disgiunti
Veneto	Presente in nuclei disgiunti
Friuli - Venezia Giulia	Presente diffusamente
Liguria	Presente diffusamente
Emilia-Romagna	Presente diffusamente
Toscana	Presente diffusamente
Marche	Presente diffusamente
Umbria	Presente diffusamente
Abruzzo	Presente diffusamente
Molise	Presente diffusamente
Lazio	Presente diffusamente
Campania	Presente diffusamente
Puglia	Presente diffusamente
Basilicata	Presente diffusamente
Calabria	Presente diffusamente
Sicilia	Presente in nuclei disgiunti
Sardegna	Presente diffusamente

Presenza del cinghiale nelle diverse regioni italiane riferita al periodo 1998 - 2000.

Da: Pedrotti L., E. Duprè, D. Preatoni, S. Toso, 2001 - Banca Dati Ungulati: *status*, distribuzione, consistenza, gestione, prelievo venatorio e potenzialità delle popolazioni di Ungulati in Italia. Biol. Cons. Fauna, 109: 1-132.

E' bene ricordare i fenomeni che hanno consentito al cinghiale (e più o meno a tutti gli ungulati selvatici) di riconquistare il territorio nazionale:

- Riaffermarsi del bosco in aree un tempo utilizzate per agricoltura e pastorizia;
- Spopolamento progressivo di montagna e collina, con conseguente abbandono di attività economiche e diminuzione del disturbo antropico e del bestiame domestico;
- Minor persecuzione e regolamentazione dell'attività venatoria.



Ma in Italia hanno soprattutto svolto un ruolo fondamentale  
le immissioni a scopo di ripopolamento che si sono  
susseguite dagli anni '50

- I contingenti di animali più utilizzati per le azioni (legali e non) di ripopolamento provenivano soprattutto da Ungheria, Cecoslovacchia, Polonia e Romania.

Queste immissioni al di là dell'incremento numerico delle popolazioni italiane, cos'hanno determinato?

- Incroci tra sottospecie differenti
- Ibridazioni con locali popolazioni di maiali bradi
- Risultato: perdita da quasi tutto il territorio nazionale della forma autoctona peninsulare





Quindi...

- Il cinghiale è l'ungulato che occupa il più vasto areale (57% del territorio nazionale). Dalle aree intensamente antropizzate, ai territori collinari fino all'alta montagna, il suo areale potenziale (fatta eccezione delle pianure prive di aree boscate) appare nella realtà italiana quasi illimitato
- **Questa incredibile capacità di espansione e sopravvivenza si spiega soprattutto attraverso due peculiarità della specie:**
  - Grande plasticità ecologica che porta il cinghiale ad essere una delle specie dalla miglior capacità adattativa a svariati contesti ambientali;
  - Eccezionale capacità riproduttiva con tassi d'incremento che possono superare anche il 200%!!!

In pratica al cinghiale è sufficiente che un ambiente garantisca queste tre condizioni vitali:

- **Acqua**
- **Cibo**
- **Copertura**



## Morfologia: *aspetto*

Il cinghiale è un ungulato di aspetto robusto, con gli arti corti (negli individui adulti la distanza del ventre dal suolo è circa un terzo dell'altezza) ed il corpo allungato; La massa corporea è decisamente spostata sull'avantreno, la testa è grande ed occupa più di un terzo della lunghezza del corpo; gli occhi sono infossati, piccoli e situati nella parte posteriore della testa. I quarti anteriori e la testa (a cuneo) sono conformati in modo tale da agevolare gli spostamenti anche in presenza di vegetazione molto fitta e intricata, mentre il disco nasale mobile e resistente (grifo) e gli incisivi inferiori a scalpello agevolano l'attività di scafo (grufolate). La coda è lunga, diritta, coperta di peli fin dalla base e termina con un ciuffo di peli più ampio (fiocco).



## Morfologia: *aspetto*

La pelle è ispessita soprattutto sul collo e sulle spalle (dove può raggiungere anche i 3 cm di spessore), in modo da consentire l'ingresso in zone a vegetazione cespugliosa e/o spinosa ed a rappresentare uno scudo protettivo nei combattimenti. La pelle ricopre un tessuto adiposo, particolarmente consistente e più sviluppato sui lati del tronco e sulle spalle, che costituisce una riserva energetica una protezione contro le asperità della vegetazione ed i rigori del clima; quest'ultima funzione appare particolarmente importante, visto che la pelliccia del cinghiale è caratterizzata da una presenza ridotta di borra con conseguente limitata capacità di isolamento termico.



## Morfologia: *mantello*

Il pelame del mantello è costituito dalla borra (sottopelo) e dalla giarra (setole); raramente di colore uniforme. La colorazione, che varia con l'aumentare dell'età, presenta diverse tonalità e sfumature che vanno dal rosso-giallastro dell'età giovanile, al grigio più o meno scuro degli adulti. La distinzione cromatica fra mantello estivo ed invernale è data solo da una tonalità più scura, quasi nera, di quello invernale (dovuta prevalentemente alla presenza di una maggiore quantità di pelo).



## Morfologia: *mantello*



Il mantello dei giovani, nei primi mesi di vita, si presenta tipicamente striato a bande longitudinali di colore giallo-bruno; dal 4°/5° mese le strie lasciano gradualmente il posto ad un mantello uniformemente rossastro che da circa un anno di vita inizierà ad essere rimpiazzato dal manto grigio-nerastro tipico degli adulti.



# Morfologia: epoche di muta

Muta estiva:  
Maggio



Muta invernale:  
fine Settembre-Ottobre

La muta del mantello viene effettuata di norma prima dagli individui giovani, seguono poi i sub-adulti e gli adulti per terminare con gli animali più vecchi o defedati e con le femmine accompagnate dalla prole.

## Morfologia: *epoche di muta*

La muta dal mantello invernale a quello estivo è molto vistosa: la sostituzione del pelo inizia da spalle e cosce, poi si estende sul dorso e a tutto il corpo; il pelo invernale si stacca in grandi ciuffi lasciando temporanee chiazze chiare di pelle nuda, mentre la muta invernale è più graduale.



## Morfologia: ghiandole e segnalazioni odorose

La pelle del cinghiale è piuttosto povera di ghiandole sudorifere e sebacee ed è questo il principale motivo per cui i cinghiali sono costretti a frequenti bagni in pozze fangose per mantenerla umida. Le ghiandole odorifere principali sono tre:

La ghiandola rostrale, posta sul grifo, svolge la funzione di lubrificazione durante i "lavori di scavo".



La ghiandola prepuziale, ovviamente presente solo nel maschio e posta sopra al pene, è di notevoli dimensioni e svolge un ruolo molto importante durante i periodi riproduttivi.

Le ghiandole carpali, situate sulla parte posteriore degli arti anteriori a livello della piega del ginocchio, hanno funzione di marcamento e riconoscimento e secernono un odore molto acre.

## Dimensioni, peso e incremento ponderale : *incremento ponderale*

Le dimensioni del cinghiale sono molto variabili e dipendono principalmente dalle origini della popolazione e/o dal grado di ibridazione con il maiale. Il peso alla nascita è di circa 700 grammi; l'accrescimento corporeo è relativamente rapido (90 - 100 grammi al giorno nel primo anno) e raggiunge i 20-40 kg alla fine del primo anno di vita; successivamente l'accrescimento diventa più irregolare e soggettivo, più lento nelle femmine, ed il peso aumenta di circa 10-15 kg. ogni anno. Il massimo sviluppo ponderale viene raggiunto dopo i 6 anni.



# Dimensioni, peso ed incremento ponderale: *dati biometrici*

## MASCHI ADULTI

Peso pieno (kg.)	60-200
Peso vuoto (kg.)	65-75 % del pieno
Altezza al garrese (cm.)	90-110
Lunghezza totale (cm.)	130-180

## FEMMINE ADULTE


Peso pieno (kg.)	50-150
Peso vuoto (kg.)	65-75 % del pieno
Altezza al garrese (cm.)	70-90
Lunghezza totale (cm.)	120-150



Le forme mediterranee sono notevolmente più piccole, ad esempio, di quelle di origine centroeuropea, questo giustifica la forbice molto ampia fra i dati biometrici minimi e massimi.

# L'ibridazione con il maiale domestico

Il fenomeno dell'**ibridazione** tra cinghiale e maiale risale a tempi storici; sembra appurato infatti che già i romani, nel I° secolo dopo Cristo, usassero mandare le scrofe di maiale in bosco per farle ingravidare dai maschi di cinghiale. Tale fenomeno, pur se molto limitato in natura, comporta la possibilità che sul territorio siano presenti ibridi di vario grado e con caratteristiche morfologiche le più disparate, valutiamo pertanto alcune caratteristiche di distinzione fra il cinghiale ed ipotetici ibridi.



# Mortalità, natalità ed incremento utile annuale: valori demografici

## Valori demografici medi per le popolazioni di cinghiale

Proporzione  
naturale dei sessi  
(SR)

1 : 1

Numero di nati

4- 6 per femmina  
adulta

Età delle primipare

2 (3)

Età massima  
raggiungibile

femmine 10  
maschi 10



Maturità sociale

femmine 2 anni  
maschi 4-5 anni

Incremento utile annuo  
(IUA)

90-180 % della  
popolazione



# Mortalità, natalità ed incremento utile annuale

Un elemento fondamentale della dinamica di popolazione del cinghiale è il **tasso di accrescimento**, inteso come numero medio di nati in rapporto alla popolazione, e che fornisce una prima indicazione circa la capacità della stessa di accrescersi.

Il tasso di accrescimento varia, anche in maniera molto consistente, in relazione a: **disponibilità di cibo** (soprattutto in autunno ed inverno), **all'età delle femmine** gravide e loro **condizioni fisiologiche** ed altro ancora come i **fattori climatici e sociali**.


Occorre inoltre valutare il fatto che in annate particolarmente favorevoli (clima mite e/o grande disponibilità alimentare) si possono registrare **due stagioni riproduttive**, in settembre ed in aprile-maggio.

In virtù di tutti questi elementi condizionanti, i tassi d'accrescimento annuo possono quindi variare notevolmente e possono andare da un **minimo dell'80 %** ad un **massimo del 200 %** della popolazione; per questo motivo nelle diapositive seguenti valuteremo due ipotetici schemi di accrescimento della popolazione: in uno considerando il tasso minimo (80%) nell'altro quello massimo (200%).



# Mortalità, natalità ed incremento utile annuale


Schema di accrescimento quantitativo di una popolazione di cinghiale non sottoposta a prelievo venatorio e per la quale sono stati considerati: un rapporto sessi di 1: 1; un tasso di accrescimento dell'80 % della popolazione ed una mortalità media del 22%.



# Mortalità, natalità ed incremento utile annuale

Schema di accrescimento quantitativo di una popolazione di cinghiale non sottoposta a prelievo venatorio e per la quale sono stati considerati: un rapporto sessi di 1: 1; un tasso di accrescimento del 200 % della popolazione ed una mortalità media del 22%.

Situazione nell'anno n.



Nelle due ipotesi considerate l'accrescimento della popolazione risulta essere del 43 % (minimo) e del 121 % (massimo); volendo trarne un dato medio di accrescimento della popolazione, questo risulta quindi essere dell'82% .

# Caratteristiche di riconoscimento e discriminazione delle classi di sesso ed età: *denominazione delle classi sociali*

CLASSE	MASCHI	FEMMINE
0	<b>Striati (<i>piccoli</i>):</b> cuccioli da 0 a 1 anno (anche se a 4/5 mesi perdono le strie)	<b>Striati (<i>piccoli</i>):</b> cuccioli da 0 a 1 anno (anche se a 4/5 mesi perdono le strie)
1	<b>Rossi (<i>giovani</i>):</b> dal 1° al 2° anno di vita (colore del mantello generalmente rossastro; progressivo aumento della tonalità bruno-nerastra)	<b>Rossi (<i>giovani</i>):</b> dal 1° al 2° anno di vita (colore del mantello generalmente rossastro; progressivo aumento della tonalità bruno-nerastra)
2	<b>Adulti:</b> Oltre i 2 anni (mantello nero o grigio-nero, struttura e caratteristiche da adulto)	<b>Adulte:</b> Oltre i 2 anni (mantello nero o grigio-nero, struttura e caratteristiche da adulta)



# Caratteristiche di riconoscimento e discriminazione delle classi di sesso: *maschi*

## Caratteristiche salienti del maschio

Testa triangolare, larga alla base e con la parte terminale del profilo fronto-nasale del cranio leggermente convessa



Canini che fuoriescono dalla rima labiale (dal 3° - 4° anno) e criniera evidente (in inverno)

Coda che, in movimento, è generalmente portata orizzontale



Pennello penico e testicoli evidente soprattutto con il mantello estivo (in estate o in fase di muta, il pennello è visibile anche negli individui giovani)



# Caratteristiche di riconoscimento e discriminazione delle classi di sesso: *femmine*



**Capizzoli tirati e ben visibili soprattutto col mantello estivo, coda portata più frequentemente pendente**




## Caratteristiche salienti della femmina

**Testa triangolare più stretta alla base ed acuta; profilo fronto-nasale del cranio rettilineo o leggermente concavo, portamento più leggero**



**Minore differenza tra quarti anteriori e quarti posteriori di quanto si verifichi nel maschio**

## CARATTERISTICHE DEL CINGHIALE



## Caratteristiche di riconoscimento e discriminazione delle classi di età: *striati*

La classe 0 (*striati*) sono i cuccioli dalla nascita ad un anno di vita (per convenzione si definiscono *striati* anche se a 4/5 mesi perdono le *strie*). Il peso alla nascita è di circa 700 grammi; presentano sul muso una sorta di "anello" di peli più scuri che va dal grugno fino alla fine della rima labiale. Dal 2° 3° mese le *strie* iniziano a ridursi, il colore del mantello tende a diventare più uniforme e scompare progressivamente l'anello scuro del muso. Oltre il 6° mese le *strie* sono scomparse ed i piccoli assumono un colore rosso giallastro. Durante gli spostamenti seguono in fila indiana la madre o si muovono all'interno di un "cerchio" creato dalle femmine adulte; al pascolo si allargano a raggiera, mantenendo le distanze dagli adulti del gruppo; sono molto vivaci e poco sospettosi.



## Caratteristiche di riconoscimento e discriminazione delle classi di età: *rossi*

La classe I (*rossi*) comprende animali dal 1° al 2° anno di vita; all'inizio hanno il mantello uniformemente rossastro (acquisito in vero già a 5-6 mesi) che gradatamente tende a diventare sempre più scuro (col progredire dell'età) fino ad essere praticamente già nerastro alla fine del secondo anno di vita. La testa è proporzionalmente più corta di quella degli adulti, ed è più stretta all'estremità; il peso va da 20 a circa 40 kg; nei maschi i canini non sporgono ancora dalla rima labiale mentre la criniera, benché ancora corta, è già visibile anche se non è mai portata eretta come nei maschi più anziani. Generalmente, durante i censimenti, non viene distinto il sesso nei *rossi*, proprio perché di difficile determinazione a distanza nell'osservazione diretta, praticamente impossibile da determinare nella conta delle tracce.



## Caratteristiche di riconoscimento e discriminazione delle classi di età: *adulti*

Gli adulti (classe II) sono gli animali che hanno più di 2 anni e presentano, in modo più o meno accentuato in relazione all'età, tutte le caratteristiche degli individui maturi: muso più allungato, testa massiccia, sbilanciamento del peso sui quarti anteriori, mantello prevalentemente bruno più o meno scuro, ecc. Al compimento del secondo anno, il mantello può avere ancora delle tonalità rossastre mentre in età avanzata aumenta la quantità di pelame grigio.




c - Porcastrone (nella 2a fase "ormonale")  
 d - Scrofa matura  
 e - Scrofa perfettamente matura ("vecchia")

**Aspetto generale del Cinghiale maschio a seconda delle classi**

**sociali (di età)**


- a - Lattonzolo o Striato
- b - Porcastro o Rosso
- c - Porcastrone (1 anno, "ormonale")
- d - Verro di 2-4 anni



**Aspetto generale del Cinghiale femmina a seconda delle classi**

**sociali (di età)**

- a - Lattonzola o Striata
- b - Porcastro (nella 1a fase ormonale)
- c - Porcastrone (nella 2a fase "ormonale")
- d - Scrofa matura
- e - Scrofa perfettamente matura ("vecchia")




# Tecniche di individuazione e determinazione dei segni di presenza: orme e tracce (gli zoccoli)

Parte terminale del piede anteriore sinistro di un maschio adulto di cinghiale

Distanza fra la linea ideale che congiunge le estremità degli speroni e quella che individua l'inizio dei fettoni negli zoccoli anteriori e posteriori di cinghiale.


Parte terminale del piede Posteriore destro di un maschio adulto di cinghiale



Nel cinghiale i fettoni sono molto voluminosi (circa 2/3 dello zoccolo) ed è questa una importante caratteristica discriminativa dell'impronta del cinghiale rispetto a quelle degli altri ungulati, solo il daino presenta dei fettoni di grandezza simile ma leggermente inferiore (circa metà dello zoccolo). Una caratteristica distintiva ancora più importante è rappresentata dagli speroni del cinghiale, che sono più lunghi e robusti di quelli di tutti gli altri ungulati e sono inoltre posizionati molto vicino agli zoccoli, a tal punto che la linea ideale che congiunge le estremità degli speroni è pressoché tangente ai fettoni negli arti posteriori, mentre in quelli anteriori tale linea interseca addirittura i fettoni a circa 1 centimetro dalla loro linea iniziale. Anche nel cinghiale l'unghia esterna è leggermente più grande ed arcuata di quella interna, anche se in modo meno evidente di quanto si verifichi nei maschi di cervo, daino e muflone.

# Tecniche di individuazione e determinazione dei segni di presenza: *orme e tracce*

In funzione delle caratteristiche anatomiche tipiche degli zoccoli del cinghiale (fettoni molto voluminosi e speroni lunghi, robusti e posizionati molto vicino agli zoccoli), l'impronta è facilmente distinguibile da quella degli altri ungulati. Infatti risulta praticamente sempre visibile il segno lasciato dagli speroni che si imprime posteriormente e di fianco ai fettoni, conferendo all'impronta una caratteristica forma trapezoidale (1). Anche il segno lasciato dai fettoni è tipico e può facilitare il riconoscimento dell'impronta qualora non risultassero visibili i segni degli speroni.



Le dimensioni dell'impronta sono molto variabili in funzione soprattutto dell'età e della razza di appartenenza, inoltre il raggiungimento del massimo sviluppo ponderale è più lento e progressivo rispetto agli altri ungulati, per questi motivi ci si può imbattere in impronte di cinghiale che vanno dai 1 cm di larghezza e 2,5 cm di lunghezza nei piccoli di pochi giorni (2) (speroni poco o per nulla visibili), a 3,5 cm di larghezza e 5 cm di lunghezza nei subadulti (3) fino ai 6 cm di larghezza e 9 cm di lunghezza nei maschi adulti (1), passando per tutte le possibili misure intermedie; le impronte delle femmine adulte e dei maschi giovani hanno dimensioni simili e leggermente inferiori a quelle massime.

# Tecniche di individuazione e determinazione dei segni di presenza: orme e tracce



La traccia (o pista) del cinghiale, come quella degli altri ungulati, è diversa in funzione dell'animale che la lascia e soprattutto del tipo di andatura (passo, trotto o galoppo). Al passo e al trotto lento le orme si presentano "doppie" (a gruppi di due), lo zoccolo posteriore calpesta l'orma dell'anteriore in modo più o meno sovrapposto in funzione della velocità (andatura più veloce, sovrapposizione maggiore); al trotto veloce la pista diventa diritta e le peste appaiono a distanza regolare e costante (immagine A), mentre al galoppo le impronte sono a gruppi di quattro (piuttosto distanziate fra loro) con le orme degli arti posteriori più allargate e che sopravanzano quelle degli anteriori.



## Tecniche di individuazione e determinazione dei segni di presenza: *escrementi o fatte*

Gli escrementi del cinghiale sono di colore nerastro ed hanno forma allungata (tipo salsiccia); le dimensioni variano molto in funzione della massa corporea e vanno dai 3 ai 6 cm di diametro, e dai 5 ai 10 cm di lunghezza (2). Col passare del tempo tendono a diventare di colore marrone o grigiastro ed a separarsi in piccole masse rotondeggianti del diametro di 3-5 cm (1).



# Tecniche di individuazione e determinazione dei segni di presenza: *escrementi o fatte*

In primavera, conseguentemente alla grande quantità di vegetali freschi ingeriti, le fatte si presentano più compatte e mollicce, costituiscono quindi masse piuttosto informi (A) che rapidamente si disgregano (in seguito anche all'opera degli insetti che si nutrono di escrementi) mostrando il materiale indigerito che non è stato finemente sminuzzato come avviene negli erbivori ruminanti, così che è possibile identificare ad occhio nudo gran parte delle componenti animali e vegetali (B).



# Tecniche di individuazione e determinazione dei segni di presenza: *grufolate*

Tipici segni di presenza del cinghiale sono i siti di scavo (*grufolate*), la cui estensione e profondità varia in relazione alla densità di animali, all'umidità del terreno ed al tipo di cibo reperibile. Legati all'attività di alimentazione sono anche i boli alimentari, costituiti in prevalenza da radici e graminacee che il cinghiale mastica ma non sempre ingerisce e che si ritrovano sul terreno in masse compatte e allungate.



# Tecniche di individuazione e determinazione dei segni di presenza: *boli alimentari*

Altri caratteristici segni di presenza del cinghiale, legati all'attività di alimentazione, sono i boli alimentari, costituiti in prevalenza da residui delle parti più coriacee dei cereali in fase di maturazione (soprattutto grano e avena) che il cinghiale mastica (utilizzando così le proprietà nutritive dei chicchi) ma non ingerisce e che si ritrovano sul terreno in masse compatte e allungate. I boli sono particolarmente abbondanti e visibili nei campi di avena, probabilmente a causa di una maggiore quantità di materiale poco digeribile e/o nutriente presente nella spiga di questo cereale



Boli alimentari ai bordi di un campo di avena



## Tecniche di individuazione e determinazione dei segni di presenza: *pozze di insogli e grattatoi*



Un altro segno di attività è rappresentato dagli **insogli**, pozze d'acqua a cui il cinghiale si reca abitualmente per il bagno di fango; la pozza non deve essere profonda né di acqua limpida in quanto la funzione che deve assolvere il "bagno" è quella di inglobare nel fango i parassiti per poi eliminarli, una volta che questo si è seccato, mediante energici sfregamenti contro rocce o tronchi d'albero.

## Tecniche di individuazione e determinazione dei segni di presenza: *pozze di insogli, grattatoi*



Nel bosco, in prossimità delle pozze di insoglio (ma a volte anche ad una certa distanza), si trovano appunto i “**grattatoi**”, di norma alberi, che possono avere la corteccia completamente asportata a causa del continuo sfregamento di numerosi cinghiali.

# Tecniche di individuazione e determinazione dei segni di presenza: *lestre*



I siti di riposo, **le lestre**, sono più difficili da notare in quanto sono prevalentemente costituiti da piccole depressioni del terreno con limitati accumuli di lettiera, situati prevalentemente nel fitto della vegetazione o in luoghi asciutti e soleggiati (se abbastanza tranquilli); le lestre dei vecchi maschi e delle femmine in procinto di partorire sono invece più voluminose e vistose poiché di solito il terreno viene approfondito ulteriormente con operazioni di scavo e vengono apportate erbe, ramaglie e foglie secche in discreta quantità.

# Habitat e alimentazione

Il cinghiale frequenta una vasta gamma di tipologie ambientali, tuttavia gli ambienti ideali sono: la foresta planiziale, la macchia mediterranea ed i boschi di latifoglie (preferibilmente con elevata presenza di essenze quali querce e/o castagno) con fitto sottobosco. Si può comunque considerare ubiquitario in quanto è da ritenersi specie opportunistica e generica, facilmente adattabile anche a rapide modificazioni ambientali; rifugge zone con innevamenti persistenti per via delle zampe corte. Se il nutrimento scarseggia si sposta anche in modo considerevole.



# Habitat e alimentazione: *preferenze ambientali*

## Altitudine

Dal livello del mare al limite della vegetazione arborea (stagionalmente anche oltre), purché con scarso innevamento.

## Preferenze ambientali del cinghiale

### Esposizione

Molto gradita, alle quote medio alte, la presenza di versanti a sud/sud-ovest in funzione della maggiore insolazione e minore permanenza del manto nevoso.

### Disturbo

Specie molto adattabile all'uomo ed alle attività agricole, può parzialmente soffrire un disturbo antropico generalizzato e costante .

### Necessità vitali

Acqua, nutrimento e copertura.

## Habitat

Boschi puri e misti di latifoglie produttrici di frutta (ghiande, faggiole, castagne), ricchi di sottobosco ed alternati a radure e prato-pascoli, secondariamente anche boschi degradati e macchie.



# Habitat e alimentazione: *strategie alimentari*

## Caratteristiche alimentari del cinghiale

### Modalità alimentare

**Forte mangiatore di vegetali grezzi, con necessità di assumere anche materiale proteico di origine animale**

### Definizione del tipo

**Monogastrico eurifagico, nomade-utilitarista, iper-trofodipendente.**

### Periodi giornalieri di attività alimentare

**2 principali al crepuscolo, prevalente quello serale che spesso si prolunga nella notte. In inverno adotta spesso un solo lungo periodo**



### N° di ore al giorno dedicate all'alimentazione

**8 - 9**

### Fabbisogno calorico giornaliero


**Circa 2015 Kcal.**

# Habitat e alimentazione: *alimentazione stagionale*


## ALIMENTAZIONE STAGIONALE DEL CINGHIALE

TIPO DI ALIMENTO	ESTATE	INVERNO
Carogne, topi, vermi	5 %	7 %
Insetti	2 %	-
Radici, tuberi	10 %	12 %
Erbe (anche coltivati)	50 %	30 %
Cespugli, piante erbacee	20 %	-
Frutta, semi	10 %	50 %
Altro	3 %	1 %

Dal punto di vista, alimentare il cinghiale è caratterizzato da una notevole **adattabilità**, è infatti un animale eurifagico essendo in grado di utilizzare alimenti di origine sia **animale** che **vegetale** ed **opportunist**, in grado cioè di sfruttare al meglio ciò che offre l'habitat. Si può infatti notare come si diversifichi la percentuale di utilizzo rispettivamente di **erba** e **frutta**, in funzione della disponibilità stagionale. In ambienti mediterranei il consumo di alimenti di origine animale si può ulteriormente ridurre a favore di frutta e semi.



Dieta stagionale dei cinghiali nel Parco della Maremma tra il 1991 e il 1996.  
 La dieta è espressa in frequenza di comparsa di categorie alimentari  
 sul totale delle feci esaminate in ogni stagione (Massei e Genov, 1998)




## Tipi di attività di foraggiamento nel cinghiale:

A: partenza dal luogo di riposo, fermata in un'area dove l'animale si alimenta a lungo e in un'area più piccola dove si ferma poco, riposo in un nuovo giaciglio;

B: fermata in un'unica area di alimentazione e ritorno al luogo di riposo precedente;

C: tragitto simile ad A, ma con frequenti e brevi soste in diverse aree di foraggiamento e ritorno al luogo di riposo di partenza.

(da Janeau e Spitz 1984, modif.)



# Fonti di disturbo, competitori e predatori

In considerazione del suo opportunismo alimentare, il cinghiale non ha praticamente competitori tra gli erbivori. Può invece essere in parziale contesa alimentare con altre specie onnivore come la volpe o, in particolari condizioni, i corvidi; in ogni caso l'ampio spettro trofico e la possibilità di rivolgersi, a fonti alimentari alternative pone il cinghiale in posizioni di vantaggio rispetto a qualsiasi eventuale competitore.



## Fonti di disturbo, competitori e predatori



Il lupo è l'unico predatore in grado di attaccare praticamente tutte le classi sociali, privilegiando ovviamente femmine e giovani, svolgendo quindi una funzione limitante (anche se parziale) nei confronti delle popolazioni di cinghiale; diversi studi hanno infatti dimostrato che il cinghiale, nell'ambito degli ungulati selvatici, riveste un ruolo predominante nella dieta del lupo. Predazioni quantitativamente e temporalmente molto limitate possono essere effettuate dalla volpe a carico degli striati nei primi giorni di vita.





# Comportamento sociale, ciclo biologico annuale, struttura di popolazione




L'unità sociale di base è il gruppo familiare, rappresentato dalla scrofa accompagnata dai suoi piccoli e dai giovani della cucciolata precedente (solitamente le femmine) a cui si possono aggiungere altri porcastri rimasti orfani o che si sono ritrovati isolati; il gruppo si può ampliare qualora si aggiungano altre unità familiari, generalmente legate da vincoli di parentela.

## Comportamento sociale, ciclo biologico annuale, struttura di popolazione

Il branco a struttura matriarcale è regolato al suo interno da una precisa gerarchia ed ha un suo territorio di pascolo difeso nei confronti di altri branchi. La femmina più anziana o più vigorosa ha il ruolo di capobranco e la prole viene accudita in comune. I porcastri nelle località meno "tranquille" sono di norma tenuti al centro di una sorta di cerchio composto dalle femmine adulte.





*Fig. 27. L'adozione sembra essere un fenomeno abbastanza comune nei cinghiali. In questo esempio, due piccoli vengono adottati da una femmina: siccome la femmina non può allattare un numero di piccoli superiore al numero dei propri figli, uno dei porchetti muore e un altro viene adottato da una terza femmina (da Delcroix et al. 1985, modif.).*




# Comportamento sociale, ciclo biologico annuale, struttura di popolazione

I maschi rimangono nel gruppo familiare fino a circa 18 mesi, poi si allontanano costituendo dei piccoli gruppi maschili non gerarchici e di breve durata che si spostano in continuazione alla ricerca di cibo (non avendo un territorio fisso di pascolo); talvolta di tali "bande" possono far parte anche giovani femmine. Questi sono i gruppi più frequentemente responsabili dei danneggiamenti alle coltivazioni. **I maschi adulti (più di tre anni) sono normalmente individui solitari e vivono quindi isolati. Un maschio adulto può accettare la compagnia (a debita distanza) di uno o al massimo due maschi giovani sottomessi (scudieri) mentre il contatto con le femmine avviene in pratica solo nel periodo degli accoppiamenti.**




# ATTIVITA' GIORNALIERE




*Fig. 14.  
Proporzione di tempo che i cinghiali di entrambi i sessi dedicano alle diverse attività (da Cuartas e Braza 1990, modif.).*


## HOME RANGE STAGIONALE



*Fig. 17. Home range stagionale, espresso in ettari, dei cinghiali del Parco della Maremma nel periodo compreso fra autunno 1991 e autunno 1993 (da Massei et al. 1997).*



Chizeé



Camargue

- |  |  |
|--|--|
|  Adulti solitari                |  Gruppo di adulti     |
|  Adulti e giovani di 5-12 mesi  |  Giovani di 5-12 mesi |
|  Gruppi con piccoli di 0-5 mesi |  |

*Proporzione dei diversi gruppi di cinghiali in due aree di studio (Chizeé e Camargue). La composizione dei gruppi e il numero medio di animali per gruppo cambiano anche in relazione alla riproduzione: se la maggior parte delle femmine ha partecipato alla riproduzione, il numero medio di animali per gruppo risulta maggiore rispetto ad anni in cui solo poche femmine si riproducono (da Gérard e Campan 1988, modif.).*

## Biologia riproduttiva (strategie, calori, accoppiamento)

**Solitamente la maturità sessuale fisiologica nelle femmine si verifica tra 8-20 mesi.** Durante il periodo degli accoppiamenti, che è molto variabile e si verifica di norma tra novembre e gennaio (e in alcuni casi, negli anni di doppio estro, ad aprile maggio e settembre), i maschi solitari si riuniscono ai branchi familiari, scacciano i maschi giovani che eventualmente ne fanno parte e che solitamente non oppongono resistenza, per poi corteggiare le femmine disponibili.



L'accoppiamento avviene dopo lunghi inseguimenti ed è lungo e complesso (può protrarsi anche per 15-20 minuti), si verifica quasi esclusivamente di notte probabilmente proprio a causa delle caratteristiche di complessità e durata che ne determinano una elevata pericolosità (attacchi di avversari o predatori, interferenze antropiche, ecc.). Le caratteristiche anatomiche del pene del cinghiale (a forma di vite) consentono il deposito dello sperma nel collo uterino anziché in vagina, aumentando così le probabilità di fecondazione.

# Biologia riproduttiva (strategie, calori, accoppiamento)

**La gestazione si protrae per 16-18 settimane.** La scrofa prima di partorire predispone una sorta di grande "nido" (lestra) utilizzando piccole depressioni del terreno approfondite ulteriormente con operazioni di scavo ed apportandovi poi un discreto accumulo di lettiera (erbe, ramaglie, foglie secche, ecc.)




All'interno della lestra di parto darà poi alla luce i piccoli che rimangono nel "nido" con la madre per circa 10 giorni. Il parto è piuttosto lungo (anche 48 ore) ed al termine la scrofa mangia la placenta ed anche eventuali piccoli morti. **La dimensione media di una figliata è di 4-5 cuccioli**

# Biologia riproduttiva (strategie, calori, accoppiamento)



In anni di disponibilità alimentare nella norma o scarsa e/o inverni piuttosto rigidi, il cinghiale si riproduce una sola volta: ad una fase di riposo sessuale (anestro) segue l'estro che si verifica di solito tra novembre e gennaio.



**Annata normale: una gestazione**

# Biologia riproduttiva (strategie, calori, accoppiamento)

In annate caratterizzate da eccezionale fruttificazione di querce, castagni, faggi, ecc. e comunque di elevata disponibilità di risorse alimentari in concomitanza con clima mite, si possono registrare due stagioni riproduttive, con accoppiamenti in settembre ed in aprile-maggio (in pratica senza fasi di anestro).



nascite

accoppiamento

anestro

gestazione

allattamento

gestazione

allattamento

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre


**Annata straordinaria: due gestazioni**


# Un anno con il cinghiale...



# Un anno con il cinghiale...

Maggio





Nino




Nina



# Un anno con il cinghiale...


Giugno - Luglio





# Un anno con il cinghiale...

fine Novembre... Dicembre - Gennaio








# Un anno con il cinghiale...

fine Gennaio






# Un anno con il cinghiale...

Febbraio - Marzo


● Fecondazione avvenuta






# Un anno con il cinghiale...

Aprile - Maggio



# Un anno con il cinghiale...

Giugno - Luglio





# Densità biotica: DB

Per **densità biotica (DB)** si intende il numero di capi per unità di superficie (di norma 1 Km<sup>2</sup>) che un determinato ambiente è in grado di sostenere senza che si verifichi un decadimento fisico della popolazione. Tale parametro deve essere valutato per ciascuna popolazione in base alle caratteristiche della stessa e dell'ambiente sul quale insiste. I valori riportati sono valori medi per tre categorie qualitative di ambiente da individuare in funzione delle preferenze della specie.



**DB** media in ambienti di qualità scadente (capi per Km<sup>2</sup>)

**3 - 5**

**DB** media in ambienti di qualità media (capi per Km<sup>2</sup>)

**6 - 15**


**DB** media in ambienti di qualità buona (capi per Km<sup>2</sup>)

**16 - 25**

**IN AMBIENTI OTTIMALI IL CINGHIALE PUO' RAGGIUNGERE UNA DENSITA' BIOTICA DI 15/25 CAPI/100 ETTARI**

# Densità agro-forestale: DAF

Per **densità agro-forestale (DAF)** si intende il numero di capi per unità di superficie (di norma 1 Km<sup>2</sup>) che, in base alle attività antropiche (agricole e/o forestali) attuate nel comprensorio in esame, sia tollerabile; viene determinata quindi in funzione dell'entità dei danni alle colture che si possono accettare e sostenere. Può di conseguenza assumere valori anche molto diversi dalla densità biotica (in funzione soprattutto della quantità e pregio delle colture presenti) compreso il valore nullo (0) equivalente alla necessità di eradicazione.



**DAF** media in ambienti con elevata quantità e/o pregio di colture agro-forestali (capi per Km<sup>2</sup>)

**0 – 1**

**DAF** media in ambienti con moderata quantità e/o pregio di colture agro-forestali (capi per Km<sup>2</sup>)

**2 – 4**

**DAF** media in ambienti con scarsa quantità e/o pregio di colture agro-forestali (capi per Km<sup>2</sup>)

**5 – 6**

# Struttura e consistenza delle popolazioni in relazione all'ambiente

Il quadro relativo alle conoscenze circa le densità e le consistenze delle diverse popolazioni italiane di cinghiale, rimane tuttora alquanto carente e poco conosciuto. Questa grave carenza d'informazioni è anche determinata dal tipo di gestione venatoria cui la specie è sottoposta. Infatti, a differenza di quanto avviene per gli altri Ungulati, cacciati di norma secondo piani d'abbattimento quantitativi e qualitativi frutto di stime annuali della consistenza delle popolazioni locali, nel caso del cinghiale, se si eccettuano rare eccezioni, non esiste un rapporto organico tra consistenza e prelievo e, pertanto, non vengono effettuati censimenti e neppure vengono calcolati indici relativi d'abbondanza su serie storiche.



Sulla base dei pochi studi sinora realizzati, nei territori sottoposti a prelievo venatorio la densità del cinghiale raramente supera i 3-5 capi/100 ha, anche se concentrazioni maggiori sono riportate in alcune aree (nella Tenuta Presidenziale di Castelporziano la densità può oscillare tra i 9 e i 39 capi/ 100 ha). La distribuzione del cinghiale e la densità delle sue popolazioni sono state in passato, e sono tuttora, condizionate dal tipo di gestione effettuata, specialmente in relazione ad importanti attività di carattere economico. L'utilizzo venatorio della specie tende a massimizzarne le presenze sul territorio, mentre l'impatto esercitato sulle attività economiche spesso impone un'azione di controllo sullo sviluppo delle popolazioni.

# Tipologie e metodi di censimento specificamente più opportuni: *conteggio delle orme*

Un metodo di censimento utilizzato per il cinghiale è il conteggio delle orme degli animali su terreno fangoso o innevato di recente. L'area da censire, a seconda dell'estensione complessiva, viene suddivisa in più zone, ciascuna delle quali viene perlustrata nella stessa giornata da gruppi di osservatori. Ciascun gruppo annota tutte le piste di Cinghiale trovate su cartine in scala adeguata (1:25.000; 1:10.000) e verifica se queste sconfinano nelle zone adiacenti. Tale metodo è di fatto molto difficile da applicare, poiché è necessario il contemporaneo realizzarsi di una serie di condizioni ottimali che si verificano piuttosto raramente; la sua buona riuscita dipende in gran parte dalla tempestività con cui il censimento viene effettuato dopo una nevicata e dalle caratteristiche del manto nevoso. In condizioni ottimali lo spessore della neve dovrebbe essere di alcuni centimetri, in modo da consentire un facile rilevamento delle impronte e da non limitare la capacità di spostamento degli animali.

Le classi di età possono essere individuate attraverso il rilevamento delle dimensioni delle impronte (lunghezza e larghezza dello zoccolo). Si assume infatti che:

- lunghezza dell'impronta fino a 4 cm = giovane dell'anno,
- lunghezza dell'impronta da 5 a 6 cm = soggetto subadulto,
- lunghezza dell'impronta oltre 7 cm = soggetto adulto.



## Dimensioni del Cinghiale in base alle impronte (misure in cm e <sup>kg</sup>)

<b>Età, sesso e classe sociale</b>	<b>Peso V</b>	<b>Lungh.</b>	<b>Altezza</b>	<b>Largh. orma anter.</b>	<b>Largh. orma post.</b>	<b>Passo</b>
Piccolo in agosto	15	60	35	2,3	2,4	25
Porcastro	20-30	80	50	3,4	2,9	30
Porcastrone estate	50	95-100	66-65	4,2	3,8	31
Porcastrone 2° Inv.	60	95-100	66-65	4,5	4	31
Cinghiale di 2 a estate	70	120	70-75	5	4,5	33
Cinghiale di 2 a. Inverno	75-80	120	70-75	5,5	5	34
Scrofa o Maschio di 3 a	85	130-135	75-80	6	5,5	37
Verro di 4-6 a	100	155	85	6,6	6	37
Solengo	≥ 125	165	90	7	6,5	47

## Tipologie e metodi di censimento specificamente più opportuni: *osservazione diretta da punti fissi, con foraggiamento*

Dal momento che le caratteristiche climatiche, morfologiche e vegetazionali dei territori collinari e montani della regione rendono molto difficile l'esecuzione del conteggio delle impronte, risulta di norma più semplice e redditizio affidarsi al conteggio diretto degli animali da punti vantaggiosi (postazioni sopraelevate), situati in prossimità di radure nelle quali siano state predisposti siti di foraggiamento per attirare gli animali. In queste condizioni il conteggio e la suddivisione degli animali in classi di sesso ed età, risulta facilitato, anche se va segnalato come la frequentazione delle «governe» da parte dei verri sia assai più saltuaria rispetto a quanto avviene per le scrofe, i rossi e gli striati; ciò può condurre ad una leggera sottostima dei maschi adulti.



# Danni e loro prevenzione: tipologie di danneggiamento

Le interazioni che una popolazione di cinghiale contrae con gli ambienti naturali e con gli ecosistemi agrari variano in maniera sensibile non solo da area ad area ma anche, all'interno della stessa zona, in relazione a periodi differenti. Generalmente tale impatto si traduce in un danno diretto, dovuto al prelievo delle parti vegetali utilizzate come alimento, ed indiretto determinato dal calpestio e dall'attività di scavo che danneggiano le piante mettendone a nudo le radici.



L'impatto del cinghiale sulle diverse tipologie ambientali, è determinato essenzialmente dalle abitudini alimentari della specie e dalle caratteristiche dell'habitat stesso; infatti la composizione floristica, la struttura e la produttività di un determinato ambiente, comportano presenze di cinghiale più o meno consistenti e "pesanti".

# Danni e loro prevenzione: tipologie di danneggiamento

## Danni che una popolazione di cinghiale può apportare al bosco

Diminuzione della biomassa vegetale (fortemente ridotta quantitativamente ma non nel numero di specie) per l'asportazione ad uso alimentare;

danneggiamento (localizzato) di alcuni alberi di notevoli dimensioni per attività di "pulizia" (grattatoi) e sfregamento delle "difese";

diminuzione delle capacità di rinnovazione del bosco per l'asportazione di semi e frutti (ghiande, fagge, castagne);

innesco di fenomeni erosivi per l'apertura di ferite nel cotico erboso a causa dell'attività di scavo.



In realtà da alcuni studi appare come, l'azione di rimescolamento determinata dall'attività di scavo del cinghiale in bosco, consenta una più facile germinazione di alcune specie forestali ed un aumento del ritmo di crescita a causa dell'interramento dei semi, del rimescolamento del terreno e del trasporto in superficie delle sostanze minerali.

# Danni e loro prevenzione: cause del danneggiamento

In ecosistemi agrari i danni assumono entità economiche evidentemente più rilevanti; infatti sia il consumo diretto (cereali, patate, foraggi, frutti, ecc.) che l'azione di calpestio e di scavo che generalmente accompagna il pascolo, arrecano danni che possono avere un notevole peso per l'economia agricola.

E' opportuno quindi individuare le cause che spingono le popolazioni di cinghiale verso le colture agrarie. Tra queste cause vale la pena ricordare: lo sviluppo e rinaturalizzazione delle zone marginali fra bosco e aree aperte coltivate, la presenza di alberi da frutto e, soprattutto, la scarsa disponibilità di alimenti energetici in bosco (ghiande, fagge, castagne) in annate di scarsa produzione o in boschi con scarsa presenza di queste essenze forestali.



## Cause che inducono il cinghiale a frequentare le coltivazioni

sviluppo e rinaturalizzazione delle zone marginali fra bosco e aree aperte coltivate

presenza di alberi da frutto e/o di essenze forestali o coltivazioni particolarmente appetite

scarsa disponibilità di alimenti energetici in bosco (ghiande, fagge, castagne) in annate di scarsa produzione.

# Danni e loro prevenzione: cause del danneggiamento

Si ritiene comunemente che il contenimento dei danni all'agricoltura causati dal cinghiale sia attuabile soltanto con il mantenimento della densità di popolazione entro limiti economicamente sopportabili. Tale considerazione nasce dall'errata convinzione che i danni siano determinati sempre e solo da una densità di popolazione elevata, non considerando altri fattori, il più importante dei quali è la destrutturazione sociale, determinata da una errata tecnica venatoria (uso esclusivo di forme di caccia non selettiva) che porta, spesso involontariamente, a favorire le classi più giovani, determinando la formazione di branchi erratici, senza territorio di pascolo. Il secondo fattore in ordine di importanza è rappresentato dai considerevoli spostamenti stagionali conseguenti in gran parte all'azione di disturbo determinata dalle cacce collettive. L'incidenza di tali fattori sull'entità del danneggiamento provocato dal cinghiale alle colture agricole, può essere ridotta (se non eliminata) mediante l'adeguamento e la correzione della strategia gestionale globale del cinghiale, mentre i metodi diretti di prevenzione dei danni possono consistere nella tutela e difesa delle coltivazioni e/o in interventi di foraggiamento.

**Fattori che determinano elevate entità di danneggiamento alle colture**



## Densità molto elevate

Contrariamente a quanto comunemente si ritiene, non è l'unico fattore di rischio e probabilmente neppure il più importante

## Destutturazione sociale:

Causata spesso da un errata tecnica venatoria, poco selettiva, che tende a favorire le classi giovani


## Nomadismo stagionale:

Spostamenti anche considerevoli conseguenti in prevalenza all'azione di disturbo esercitata dalle cacce collettive


TAB. 6. *Effetto della caccia sull'home range (in ettari) di cinghiali di una popolazione della Francia meridionale (Maillard e Fournier 1995).*

Cinghiali dotati di radiocollare	Home range maggio-agosto	Home range settembre-dicembre (periodo di caccia)	Home range gennaio-aprile
F1	422	2.036	
F2	524		
F3	335	15.440	5.830
F4	160	6.213	3.192
F5	360	497	
F6	179		
F7	150		
F8	139	4.616	
F9	194	4.785	
F10	46	859	394
F11	281	6.668	
M1	923		
M2	1.196	3.698	197
M3	730	1.292	
M4	1.043	2.197	896

## Frutti forestali disponibili



## Frutti forestali scarsi



# Danni e loro prevenzione: sistemi di difesa

## Principali metodi di difesa diretta delle colture

Barriere di tipo fisico

repellenti chimici

repellenti acustici

emissione di detonazioni, ultrasuoni  
o versi d'allarme specifici registrati

prodotti che modificano e alterano l'odore o le  
caratteristiche organolettiche delle colture

recinzioni metalliche o elettrificate

**La recinzione metallica risulta il metodo più efficace (se ben realizzata) ma particolarmente oneroso, mentre la recinzione elettrica è altrettanto efficace, più economica, ma con maggiori necessità di manutenzione.**



## Limiti applicativi

Ai repellenti acustici gli animali si abitano facilmente e piuttosto velocemente.

I repellenti chimici hanno durata ed efficacia limitata poiché dilavati da pioggia e rugiada

## Danni e loro prevenzione: *repellenti chimici ed acustici*

Durante uno studio condotto per verificare i diversi sistemi di prevenzione dei danni, i 25 repellenti chimici impiegati, agenti sul sistema olfattivo o gustativo, si sono dimostrati efficaci per soli 3-4 giorni. Risultati analoghi per quanto concerne la durata dell'effetto deterrente si sono avuti con i repellenti acustici, costituiti da colpi sparati con cannoncini o da generatori di suoni, oppure da emissione del verso di allarme specifico del Cinghiale precedentemente registrato; in tutti i casi gli animali vanno incontro ad assuefazione in brevissimo tempo. Tratto da: Tosi G., S. Toso, 1992. Indicazioni generali per la gestione degli ungulati. Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, Documenti tecnici, 11. (Modificato)



# Danni e loro prevenzione: *recinzioni metalliche ed elettrificate*

Conseguentemente ai costi elevati della recinzione metallica, la recinzione elettrificata sembra poter fornire i migliori risultati in termini di rapporto "costi-benefici": si compone di due fili elettrificati posti rispettivamente a circa 25 e 50 cm dal suolo e fissati, ad intervalli regolari ed in funzione della morfologia del terreno, a paletti di supporto in plastica, fibra di vetro, legno. Generalmente disposta attorno alle parcelle, può anche essere installata a protezione globale delle colture, qualche metro all'interno dell'area boscata confinante con i campi stessi. Il sistema di elettrificazione si basa su impulsi molto brevi, ad alto voltaggio (5-6.000 Volts) ed è tale da rimanere efficiente anche nel caso di contatto dei fili con erbe o rami; pare che la recinzione elettrica risulti vantaggiosa per appezzamenti di dimensioni limitate investiti a colture di alto pregio.

Tratto da: Tosi G., S. Toso, 1992. Indicazioni generali per la gestione degli ungulati. Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, Documenti tecnici, 11. ( Modificato)



Recinzione metallica a difesa delle singole piante (più adatta a prevenire danni da cervidi che da cinghiale)



Recinzione elettrificata (a due fili e con pali in legno) a difesa di un campo di grano



Alimentatore della recinzione elettrificata ricaricato da un pannello solare (per ridurre i tempi e costi della manutenzione)

# Danni e loro prevenzione: *foraggiamento complementare*



Tenendo presente che il cinghiale si rivolge alle colture agricole prevalentemente quando non trova alimento sufficiente in bosco, il foraggiamento complementare o di dissuasione si configura come intervento tale da limitarne la presenza nei coltivi; detto foraggiamento può essere completamente artificiale se l'alimento viene fornito direttamente dall'uomo in apposite governe, costantemente rifornite, oppure semi-naturale se vengono seminati appezzamenti di colture "a perdere" destinate al cinghiale, oppure completamente naturale nel caso in cui la produttività del bosco venga aumentata, ad esempio allungando i turni dei cedui quercini, in modo da incrementare la produzione di ghianda.

## Catture ed interventi di carattere limitativo



L'analisi di alcune delle esperienze sinora realizzate in ambito italiano indica come le catture mediante recinti o trappole possano rappresentare un efficace metodo di controllo delle popolazioni di Cinghiale. Va tuttavia precisato che le catture non sono uno strumento necessariamente alternativo agli abbattimenti; le due modalità di prelievo infatti possono essere utilizzate in maniera sinergica nella stessa area (magari in momenti diversi nel ciclo annuale).

Nel caso del Cinghiale, il sistema di cattura in grado di fornire i migliori risultati in termini di rapporto costi-benefici, è quello che prevede l'uso di recinti di cattura (fissi o mobili, generalmente detti "chiusini") e/o di trappole mobili, in cui gli animali vengono attirati con un'esca alimentare.

## Catture ed interventi di carattere limitativo: "chiusini"

I chiusini sono di solito costituiti da pannelli modulari generalmente di forma rettangolare che, assemblati ad incastro ed ancorati al terreno ed a sostegni idonei, permettono la cattura degli animali per mezzo di una o due porte a ghigliottina dotate un meccanismo di chiusura azionato dagli animali stessi. L'efficienza di questo sistema dipende da diversi fattori tra cui la densità dei cinghiali, il numero di recinti attivi e correttamente gestiti per unità di superficie e l'offerta alimentare, in termini di quantità e qualità, prodotta dall'ambiente. Poiché tale offerta non è costante durante l'anno, l'efficienza dei chiusini varia considerevolmente a seconda delle stagioni, con picchi che tendenzialmente si collocano nella tarda estate in ambienti di tipo mediterraneo e nella seconda metà dell'inverno in quelli a clima continentale.



## Catture ed interventi di carattere limitativo: trappole mobili

In alternativa o in aggiunta ai chiusini, possono essere utilizzate trappole o recinti mobili, particolarmente interessanti per le ridotte dimensioni, la facilità di montaggio e la rapidità di trasporto. Si tratta di strutture completamente chiuse costruite assemblando pannelli di forma varia costituiti da un'intelaiatura in ferro alla quale è fissata una rete elettrosaldata a maglia quadrata. Come nel caso dei chiusini, anche le trappole sono provviste di una porta "a ghigliottina" collegata al meccanismo di scatto, posizionato in prossimità della parete opposta. I risultati ottenibili con queste trappole sono buoni sotto tutti gli aspetti (praticità di messa in opera, capacità di cattura, incolumità degli animali), con l'unico limite del ridotto numero di animali trappolabili per ogni evento di cattura (in genere solo uno o due). Diverse esperienze hanno mostrato come, disponendo di un buon numero di queste trappole e cambiando frequentemente la loro ubicazione sul territorio (soprattutto dopo una serie di catture) sia possibile ottenere ottimi risultati in termini di numero di animali catturati per notte/trappola.



# Impostazione dei piani di prelievo

Per la formulazione dei piani annuali di prelievo è indispensabile valutare attentamente i risultati delle stime quantitative delle diverse popolazioni, considerando sia l'entità sia la struttura della popolazione. Dato l'incremento utile annuo elevato caratteristico della specie, è considerato accettabile per gli adulti un prelievo massimo pari al 50% della loro consistenza, mantenendo costante un rapporto sessi paritario; per gli animali appartenenti alle classi giovanili viene generalmente suggerito un prelievo dell'80% in modo da evitare un ringiovanimento eccessivo della popolazione che invece sembra essere una caratteristica della maggior parte delle attuali popolazioni italiane, come conseguenza del tipo di gestione venatoria cui vengono sottoposte.

Tratto da: Tosi G., S. Toso, 1992. Indicazioni generali per la gestione degli ungulati. Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, Documenti tecnici, 11.

Classe di sesso	Classe di età	% sul totale dei capi da abbattere	% per classe di età
Giovani	Maschi	35-40 %	70-80 %
	Femmine	35-40 %	
Adulti	Maschi	20 - 25 %	40-50 %
	Femmine	20 - 25 %	

In estrema sintesi il prelievo deve essere il più possibile **equilibrato nelle classi di sesso** (meglio se paritario) ed invece **squilibrato nelle classi di età** (prelevare circa il **60% e oltre** del piano **dalla classe giovanile**) per evitare un eccessivo e pericoloso ringiovanimento della popolazione. L'entità complessiva del prelievo può essere individuata fra il **55** ed il **65%** della popolazione.

Cinghiale: *fine*

